

Questionario 2 - Codice: A

-
- 1) "Assistenza al paziente collaborativo che necessita di pappagallo per la minzione"
- A) 1) Svuotare l'urina nel lavandino del bagno - 2) Lasciare da solo il paziente per circa due ore - 3) Consegnare il pappagallo al paziente
- B) 1) Provvedere alla privacy del paziente - 2) Consegnare il pappagallo al paziente - 3) Controllare l'urina come richiesto
- C) 1) Sistemare il pappagallo in bagno - 2) Spiegare al paziente che il pappagallo deve essere usato in bagno - 3) Valutare l'urina in modo scientifico
-
- 2) "Misurazione radiale della frequenza e del ritmo del polso"
- A) 1) Porre la punta delle prime due dita sul lato del polso - 2) Contare le pulsazioni per 60 secondi e valutare il ritmo dei battiti - 3) Registrare la frequenza ed il ritmo
- B) 1) Premere con il pollice la parte superiore del polso del paziente - 2) Contare le pulsazioni per 2 minuti e moltiplicarle per tre - 3) Valutare il ritmo dei battiti osservando la loro persistenza
- C) 1) Porre la punta del dito medio vicino il gomito del paziente - 2) Registrare i battiti contando le pulsazioni per 15 secondi - 3) Valutare il ritmo dei battiti verificandone il numero
-
- 3) "Disinfezione dei dispositivi medici semicritici (laringoscopio, endoscopio, ecc.)"
- A) 1) Risciacquare il dispositivo con acqua corrente - 2) Far bollire il dispositivo in una soluzione acida - 3) Immergere subito il dispositivo in un contenitore con ghiaccio
- B) 1) Detergere, risciacquare ed asciugare il dispositivo - 2) Disinfettare il dispositivo - 3) Risciacquare il dispositivo con acqua sterile
- C) 1) Immergere il dispositivo in acqua e ghiaccio - 2) Risciacquare il dispositivo con acqua corrente - 3) Far bollire il dispositivo in una soluzione basica
-
- 4) "Preparazione al posizionamento del paziente nel letto"
- A) 1) Camplare eventuali tubi o altri dispositivi presenti - 2) Valutare la soglia di dolore del paziente in posizione statica - 3) Accertarsi che il paziente sia digiuno
- B) 1) Determinare il grado di assistenza richiesto dal paziente - 2) Controllare la presenza di tubi o altri dispositivi e metterli al sicuro - 3) Valutare la soglia di dolore del paziente durante gli spostamenti
- C) 1) Far scendere il paziente dal letto e valutare la soglia di dolore - 2) Anestetizzare il paziente - 3) Non toccare eventuali tubi o altri dispositivi presenti
-
- 5) "Assistenza del paziente nell'utilizzo delle stampelle per scendere le scale"
- A) 1) Regolare le stampelle in modo tale che i gomiti del paziente siano flessi - 2) Aiutare il paziente ad alzarsi e stare in piedi - 3) Chiedere al paziente di spostare le stampelle sul primo gradino e poi di avanzare con la gamba sana sullo stesso gradino e far ripetere la sequenza
- B) 1) Chiedere al paziente di alzarsi da solo - 2) Regolare l'altezza di ciascuna stampella in modo tale che le braccia del paziente siano drittte - 3) Chiedere al paziente di spostare entrambe le stampelle sul primo gradino e poi di avanzare con le gambe
- C) 1) Chiedere al paziente di poggiare la gamba malata sulla stampella - 2) Regolare l'altezza delle stampelle in modo tale che le braccia del paziente siano perfettamente tese - 3) Aiutare il paziente ad alzarsi e stare in piedi
-
- 6) "Misurazione della pressione arteriosa"
- A) 1) Applicare il bracciale gonfio al braccio del paziente - 2) Con la valvola chiusa utilizzare la pompa per sgonfiare il bracciale - 3) Quando non si sentono più pulsazioni a livello dell'arteria brachiale annotare il valore indicato dallo sfigmomanometro
- B) 1) Utilizzare la pompa per gonfiare rapidamente il bracciale - 2) Applicare il bracciale gonfio al braccio del paziente - 3) Quando non si sentono più pulsazioni a livello dell'arteria femorale annotare il valore indicato dallo sfigmomanometro
- C) 1) Applicare il bracciale sgonfio al braccio del paziente - 2) Con la valvola chiusa, utilizzare la pompa per gonfiare rapidamente il bracciale - 3) Quando non si sentono più pulsazioni a livello dell'arteria brachiale annotare il valore indicato dallo sfigmomanometro
-
- 7) "Trasferimento del paziente dal letto alla barella"
- A) 1) Posizionare il paziente al centro del letto - 2) Abbassare il letto all'altezza delle ginocchia - 3) Bloccare le ruote del letto e liberare la barella
- B) 1) Alzare la barella all'altezza del petto - 2) Posizionare il paziente lontano dal letto - 3) Bloccare le ruote della barella e liberare il letto
- C) 1) Sollevare il letto all'altezza della vita - 2) Bloccare le ruote del letto e della barella - 3) Posizionare il paziente sul bordo del letto più vicino alla barella
-
- 8) "Controllo del paziente in trazione"
- A) 1) Controllare l'allineamento della trazione - 2) Assicurarsi che i pesi pendano liberamente - 3) Verificare che i pesi non poggino sul letto
- B) 1) Verificare che non ci sia controtrazione - 2) Assicurarsi che l'arto interessato si muova liberamente - 3) Assicurarsi che i pesi non pendano liberamente
- C) 1) Assicurarsi che i pesi utilizzati siano sterilizzati - 2) Verificare che i pesi poggino sul pavimento - 3) Assicurarsi che le corde siano fuori dalla carrucola
-

9) "Frizionamento alcolico per l'igiene delle mani"

- A) 1) Applicare una dose di soluzione alcolica sulle mani - 2) Frizionare i polpastrelli della mano destra sul palmo della mano sinistra e viceversa - 3) Frizionare palmo contro palmo e palmo contro dorso
- B) 1) Frizionare dorso contro dorso e palmo contro palmo - 2) Frizionare i polpastrelli tra di loro - 3) Applicare una dose di soluzione alcolica sulle mani
- C) 1) Frizionare il palmo della mano destra sul palmo della mano sinistra e viceversa - 2) Applicare una dose di soluzione alcolica sulle mani - 3) Frizionare dorso contro dorso e viceversa

10) "Preparazione alla somministrazione dei farmaci per via oculare"

- A) 1) Preparare il paziente facendogli assumere la posizione prona - 2) Pulire le palpebre del paziente - 3) Asciugare le palpebre del paziente
- B) 1) Pulire e asciugare l'area periorbitale del paziente - 2) Preparare il paziente alzandogli la testa - 3) Sistemare il paziente in posizione Sims
- C) 1) Sistemare il paziente in posizione supina - 2) Preparare il paziente alzandogli la testa - 3) Pulire e asciugare l'area periorbitale del paziente

11) "Assistenza del paziente all'assunzione di farmaci"

- A) 1) Far assumere al paziente la posizione supina - 2) Consegnare il farmaco al paziente per la preparazione - 3) Lasciare da solo il paziente per l'assunzione del farmaco
- B) 1) Preparare il farmaco secondo le modalità prescritte - 2) Far assumere al paziente la giusta posizione - 3) Aiutare il paziente all'assunzione del farmaco
- C) 1) Aiutare il paziente nella preparazione del farmaco - 2) Lasciare da solo il paziente per l'assunzione del farmaco - 3) Far assumere al paziente la posizione che preferisce

12) "Igiene della stomia del paziente"

- A) 1) Togliere il materiale fuoriscito con delle garze imbevute di etere - 2) Strappare la sacca usata dal corpo del paziente - 3) Gettare la sacca usata nel contenitore dei rifiuti
- B) 1) Scollegare la sacca usata dal bordo della parte superiore - 2) Gettare la sacca usata nel contenitore dei rifiuti - 3) Togliere il materiale fuoriscito con delle garze asciutte
- C) 1) Scollegare la sacca usata dal bordo della parte inferiore - 2) Togliere il materiale fuoriscito con una spatola - 3) Svuotare il contenuto della sacca sporca nel WC

13) "Lavaggio dei capelli al paziente"

- A) 1) Collocare la vasca dello shampoo sopra la testa del paziente - 2) Mettere il paziente in posizione prona - 3) Sistemare un cuscinetto sotto il mento del paziente
- B) 1) Posizionare una bacinella sul comodino affianco al letto del paziente - 2) Posizionare il paziente seduto sul letto con la testa in avanti - 3) Collocare la vasca dello shampoo sulle gambe del paziente
- C) 1) Abbassare la testa del letto e mettere il paziente in posizione supina - 2) Sistemare un cuscinetto arrotolato sotto le spalle - 3) Collocare la vasca dello shampoo sotto la testa ed il collo del paziente

14) "Raccolta di materiale fecale"

- A) 1) Indossare i guanti sterili ed assistere il paziente ad eseguire l'igiene anale - 2) Chiedere al paziente di suonare il campanello appena terminato i bisogni - 3) Prelevare l'intero quantitativo di feci ed inserirlo in un contenitore adeguato
- B) 1) Chiedere al paziente di inserire nel contenitore etichettato un minimo quantitativo di feci - 2) Chiedere al paziente di suonare il campanello appena terminata la raccolta - 3) Indossare i guanti monouso ed assistere il paziente ad eseguire l'igiene anale
- C) 1) Chiedere al paziente di suonare il campanello appena terminato i bisogni - 2) Indossare i guanti monouso ed assistere il paziente ad eseguire l'igiene anale - 3) Prelevare con l'apposita palettina un minimo quantitativo di feci ed inserirle nel contenitore etichettato

15) "Assistenza post-mortem"

- A) 1) Rimuovere cateteri e tubi - 2) Porre un presidio per incontinenza - 3) Preparare la salma per l'obitorio
- B) 1) Chiedere ai parenti di preparare la salma per l'obitorio - 2) Attaccare un'etichetta identificativa all'orecchio - 3) Rimuovere il presidio per incontinenza
- C) 1) Rimuovere il presidio per incontinenza - 2) Camplare cateteri e tubi - 3) Preparare la salma per l'obitorio

16) "Igiene perineale del paziente maschio"

- A) 1) Nel maschio circonciso aprire il prepuzio - 2) Lavare l'asta del pene con leggeri movimenti verso l'alto - 3) Evitare di bagnare il glande e il meato uretrale
- B) 1) Con movimenti orizzontali, effettuare il lavaggio del meato verso l'interno - 2) Nel maschio circonciso aprire il prepuzio evitando di toccare il glande - 3) Lavare, sciacquare e asciugare l'addome
- C) 1) Lavare il glande ed il meato uretrale - 3) Nel maschio circonciso tirare e chiudere il prepuzio - 3) Lavare l'asta del pene con leggeri movimenti verso il basso

17) "Vestizione/svestizione del paziente emplegico"

- A) 1) Dopo la vestizione del paziente registrare il dato - 2) Contattare il medico e illustrare quanto svolto - 3) Effettuare il lavaggio chirurgico
- B) 1) Dopo la vestizione del paziente effettuare il lavaggio chirurgico delle mani - 2) Sistemare il paziente in posizione supina - 3) Contattare il medico e illustrare quanto svolto
- C) 1) Dopo la vestizione del paziente aiutarlo a trovare una posizione comoda - 2) Effettuare il lavaggio delle mani - 3) Registrare il dato

18) "Riordino del carrello di emergenza su indicazioni dell'infermiere"

- A) 1) Assicurarsi che i blocchi del carrello siano stati protocollati - 2) Se qualche blocco non è stato protocollato contattare il deposito - 3) Far sostituire il carrello secondo i protocolli scientifici
- B) 1) Aprire la bombola di ossigeno - 2) Assicurarsi che i blocchi del carrello siano correttamente numerati - 3) Se qualche blocco non è integro contattare il servizio di sicurezza
- C) 1) Assicurarsi che i blocchi del carrello siano correttamente sigillati - 2) Ispezionare visivamente il numero dei blocchi presenti sul carrello 3) Se qualche blocco non è integro avvisare l'infermiere

19) "Assistenza al paziente con vomito o nausea"

- A) 1) Indossare i guanti - 2) Far mangiare il paziente - 3) Garantire la privacy
- B) 1) Attendere che il paziente finisca di mangiare - 2) Indossare i guanti sterili - 3) Garantire la privacy
- C) 1) Garantire la privacy al paziente - 2) Indossare i guanti monouso - 3) Allontanare il paziente dalla tavola o altre fonti che possono scatenare nausea o vomito

20) "Utilizzo di una stoffa sterile"

- A) 1) Prelevare la stoffa dall'involucro - 2) Porre la stoffa su una superficie contaminata - 3) Strappare l'involucro
- B) 1) Porre la stoffa su una superficie umida - 2) Strappare l'involucro - 3) Prelevare la stoffa dall'involucro
- C) 1) Afferrare l'involucro dal bordo non sigillato - 2) Prelevare la stoffa dall'involucro - 3) Porre la stoffa su una superficie pulita e asciutta

21) "Posizionamento del paziente allettato"

- A) 1) Controllare la presenza di nei sulla cute del paziente - 2) Cambiare la posizione del paziente 2 volte al giorno - 3) Far indossare al paziente le calze antitrombo e abbassare le sponde laterali del letto
- B) 1) Controllare la presenza di abrasioni sulla cute del paziente - 2) Cambiare la posizione del paziente ogni 2 ore - 3) Sollevare le sponde laterali del letto e mettere il paziente in sicurezza
- C) 1) Cambiare la posizione del paziente ogni 6 ore - 2) Abbassare le sponde laterali del letto - 3) Controllare la presenza di melanomi sulla cute del paziente

22) "Assistenza del paziente nella deambulazione in presenza di paralisi parziale"

- A) 1) Fare pochi passi indietro per valutare l'equilibrio e la forza del paziente - 2) Aiutare il paziente ad alzarsi e posizionarsi davanti a lui - 3) Utilizzare la cintura tirando il paziente in avanti
- B) 1) Mantenere la cintura al collo del paziente - 2) Aiutare il paziente ad alzarsi e posizionarsi al lato debole del paziente - 3) Far saltare il paziente per valutare equilibrio e forza
- C) 1) Aiutare il paziente ad alzarsi - 2) Fare pochi passi in avanti per valutare l'equilibrio e la forza del paziente - 3) Mantenere la cintura al centro della schiena del paziente

23) "Rimozione dei guanti monouso"

- A) 1) Rimuovere i guanti tirandoli dalle dita - 2) Rivoltare i guanti sfilati dalla parte esterna - 3) Inserirli l'uno nell'altro
- B) 1) Rimuovere con i denti il guanto della mano destra - 2) Ripetere l'operazione per l'altro guanto - 3) Annodare i guanti tra loro
- C) 1) Afferrare con una mano la parte esterna del guanto dell'altra mano - 2) Tirare via il guanto e rovesciarlo - 3) Tirare via l'altro guanto su quello rimosso

24) "Primo soccorso - Posizionamento delle mani per un corretto MCE (Massaggio Cardiaco Esterno)"

- A) 1) Intecciare le dita delle mani - 2) Porre il palmo della mano al centro dell'addome - 3) Poggiare l'altra mano accanto alla prima
- B) 1) Porre il dorso nella mano sul cuore - 2) Poggiare il pugno dell'altra mano nel palmo della prima - 3) Chiudere le mani
- C) 1) Porre il palmo della mano al centro del torace - 2) Poggiare la base del palmo dell'altra mano sopra la prima - 3) Intecciare le dita delle mani

25) "Igiene dei denti con paziente incosciente"

- A) 1) Lavarsi le mani ed eseguire le precauzioni standard - 2) Inumidire lo spazzolino da denti e applicarvi il dentifricio - 3) Aprire delicatamente la bocca del paziente utilizzando un abbassalingua o inserendo l'apribocca
- B) 1) Aprire delicatamente la bocca del paziente utilizzando le dita della mano - 2) Lavarsi le mani ed eseguire le precauzioni standard - 3) Applicare il dentifricio sullo spazzolino da denti e bagnarlo sotto l'acqua corrente
- C) 1) Applicare il dentifricio sullo spazzolino da denti e bagnarlo sotto l'acqua corrente - 2) Indossare i guanti sterili - 3) Forzare la bocca del paziente utilizzando un forcipe

26) "Rilevazione della glicemia capillare"

- A) 1) Inserire l'ago della siringa nel glucometro - 2) Effettuare il lavaggio chirurgico delle mani - 3) Pulire il polpaccio del paziente con cotone e antisettico
- B) 1) Frizionare le mani con gel antisettico e indossare i guanti monouso - 2) Pulire il polpastrello del paziente con cotone e antisettico - 3) Inserire la lancetta rilevatrice nel glucometro
- C) 1) Pulire il polpastrello del paziente con soluzione fisiologica - 2) Inserire la lancetta rilevatrice nel termometro - 3) Frizionare le mani con gel antisettico e indossare guanti, mascherina e camice monouso

27) "Misurazione rettale della temperatura corporea"

- A) 1) Con il paziente in posizione supina, posizionare la punta del termometro nell'ampolla rettale e mantenere la posizione per circa 2 minuti - 2) Rilevare il parametro - 3) Rimuovere il termometro e posizionare la cuffietta monouso
- B) 1) Togliere il termometro dall'apposita custodia e posizionare la cuffietta monouso - 2) Posizionare la punta del termometro nell'ampolla rettale del paziente mantenendo la posizione per circa 4 minuti - 3) Rimuovere il termometro e rilevare il parametro
- C) 1) Togliere il termometro dall'apposita custodia e posizionare la punta nell'ampolla rettale del paziente - 2) Posizionare la cuffietta monouso e mantenere la posizione per circa 10 minuti - 3) Rimuovere il termometro e rilevare il parametro

28) "Assistenza al paziente durante l'alimentazione"

- A) 1) Valutare nel paziente la capacità di mangiare velocemente - 2) Effettuare un'ecografia al paziente - 3) Controllare il peso del paziente
- B) 1) Effettuare una gastroscopia al paziente - 2) Valutare l'appetito del paziente - 3) Controllare nel paziente eventuali allergie ai cibi
- C) 1) Valutare nel paziente la capacità di deglutire - 2) Valutare nel paziente la capacità di alimentarsi da solo - 3) Controllare nel paziente eventuali allergie ai cibi

29) "Esecuzione dell'igiene dei piedi"

- A) 1) Lavare e risciacquare accuratamente il piede del paziente - 2) Tagliare le unghie con il tronchesino - 3) Massaggiare il piede con crema emolliente
- B) 1) Massaggiare il piede del paziente con crema emolliente - 2) Lavare e risciacquare accuratamente il piede del paziente - 3) Limare le unghie
- C) 1) Tagliare le unghie del paziente - 2) Applicare al piede un bendaggio all'ossido di zinco - 3) Lavare e risciacquare accuratamente il piede del paziente

30) "Assistenza al paziente nell'assunzione dei farmaci con inalatore fuori dalla bocca"

- A) 1) Chiedere al paziente di posizionare il dispositivo a una distanza di 3-4 cm dalla bocca - 2) Chiedere al paziente di tenere la bocca aperta e premere il pulsante - 3) Invitare il paziente a trattenere il respiro per 10 secondi
- B) 1) Invitare il paziente a trattenere il respiro per 30 secondi - 2) Far aprire bene la bocca al paziente e posizionare all'interno il dispositivo - 3) Chiedere al paziente di tenere la bocca chiusa e premere il pulsante
- C) 1) Far aprire bene la bocca al paziente ed invitarlo a trattenere il respiro - 2) Posizionare il dispositivo a una distanza di 15 cm dalla bocca - 3) Invitare il paziente a chiudere la bocca e premere il pulsante

QUESITI DI RISERVA

r. 1) "Assistenza al paziente con crisi convulsiva"

- A) 1) Ruotare subito in posizione prona il paziente - 2) Forzare le mascelle per introdurre il distanziatore - 3) Notare e registrare i primi sintomi
- B) 1) Notare e registrare i primi sintomi - 2) Prestare attenzione alle parti del corpo coinvolte - 3) Proteggere il capo del paziente e ruotarlo su un fianco
- C) 1) Somministrare subito al paziente del cortisone - 2) Far alzare subito il paziente - 3) Prestare attenzione alle parti del corpo non coinvolte

r. 2) "Lavaggio dello strumento chirurgico"

- A) 1) Indossare il camice monouso - 2) Indossare la mascherina chirurgica a triplo strato - 3) Indossare la tuta di sicurezza
- B) 1) Indossare i guanti di gomma - 2) Indossare visiera e cappellino - 3) Indossare il camice impermeabile
- C) 1) Indossare i calzari in lattice - 2) Non usare i guanti - 3) Notare tutti i sintomi

r. 3) "Rilevazione della saturazione"

- A) 1) Ordinare il materiale da usare - 2) Somministrare la saturazione - 3) Sostituire l'apparecchio usato
- B) 1) Effettuare la rilevazione della saturazione - 2) Riordinare il materiale usato - 3) Detergere e disinfettare l'apparecchio
- C) 1) Spolverare l'apparecchio con un panno - 2) Effettuare la rilevazione della saturazione - 3) Riordinare il materiale usato